

GEBRAUCHSANWEISUNG,
BITTE AUFMERKSAM LESEN!

EMCUR® FUSSPILZ-GEL



WAS IST EMCUR® FUSSPILZ-GEL?

Zweckbestimmung: **Emcur® Fußpilz-Gel** ist ein Medizinprodukt zur Behandlung von Fußpilz. **Emcur® Fußpilz-Gel** enthält eine Tube (20 ml) mit Applikator. Für Erwachsene und Kinder ab 4 Jahren.

WAS IST FUSSPILZ?

Fußpilz oder Tinea pedis ist eine Pilzinfektion der Haut an den Füßen. Es wird zwischen **3 verschiedenen Formen** unterschieden:

- + **Tinea pedis interdigitalis** ist eine Infektion der Zehe zwischenräumen, die am häufigsten zwischen dem vierten und fünften Zeh und nachfolgend zwischen dem dritten und vierten Zeh auftritt. Typische Symptome sind Juckreiz, weiße und aufgewollene Haut, Rötung, Nässen und Schuppung. Häufig wird sie aufgrund einer bakteriellen Superinfektion von einem üblen Geruch begleitet.
- + **Tinea-pedis-Mokassin-Typ** tritt in Form feiner, klebförmiger Schuppung mit silbrig-weißen, sich ablösenden Hautpartikeln auf einer geröteten, verdickten Basis auf, die sich über die Sohle, die Ferse und die Fußsohlenseite erstreckt. Diese Form neigt dazu, chronisch zu werden.
- + **Vesikulöse Tinea pedis** befällt für gewöhnlich die Fußsohle, kann aber auch an der Fußsohlenseite auftreten. Es bilden sich Bläschen oder Pusteln und der befallene Bereich kann aufquellen, eine sekundäre Infektion durch Bakterien, die üblen Geruch verursachen kann, ist die mögliche Folge.

WIE ENTSTEHT FUSSPILZ?

Viele Faktoren begünstigen die Entstehung von Fußpilz: Wärme, das Tragen geschlossener Schuhe, bestimmte Sportarten (z. B. Schwimmen, Wandern oder Marathonläufe) und Situationen, in denen die Füße schwitzen, aufgeweicht oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Fußpilz kann auch durch einen Pilzbefall nach einer vorherigen Infektion des Nagels, wie zum Beispiel Onychomykose (Nagelpilz), entstehen.

Unzureichend oder nicht behandelte Nagelpilzinfektionen können sich ausbreiten und Fußpilz verursachen. Bestimmte Personengruppen können anfälliger für eine Fußpilzinfektion sein. Beispielsweise sind dies Diabetiker, Patienten mit Durchblutungsstörungen oder auch Berufsgruppen, die Sicherheitsschuhe oder -stiefel tragen müssen. Ohne Behandlung kann sich der Zustand verschlechtern, die Infektion kann auf andere Bereiche wie die Nägel übergreifen oder auch auf andere Personen übertragen werden.

DOSIERUNG UND ANWENDUNG

- + Sofort nach dem Auftreten der Symptome, z. B. Juckreiz, gerötete Haut, Brennen, übler Geruch oder Schuppung der Haut, **zweimal täglich eine dünne Schicht auf die befallenen Bereiche auftragen**, bis die Symptome abgeklungen sind.
- + **Setzen Sie die Behandlung nach dem Abklingen der Symptome noch 2 Wochen fort**, um ein Wiederauftreten zu verhindern.
- + Wenn sich die Symptome nach 14 Tagen nicht gebessert haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

INHALTSSTOFFE

PEG-6, ethyl alcohol, aqua, ethyl lactate, pentylene glycol, glyceryl undecylenate, ammonium acryloyldimethyltaurate/VP copolymer, glycerine, dimethyl isosorbide, lactic acid, phenoxyethanol, sodium caproyl/lauroyl lactylate, menthol, hydroxyethyl cellulose, menthyl lactate.

WECHSELWIRKUNGEN

Nach aktuellem Kenntnisstand kann **Emcur® Fußpilz-Gel** in Verbindung mit anderen Produkten verwendet werden. Bei Verwendung einer Fußcreme bitte **Emcur® Fußpilz-Gel** mindestens 15 Minuten vorher auftragen.

ANWENDUNGSHINWEISE

- + **Emcur® Fußpilz-Gel** ist nur zur äußeren Anwendung geeignet.
- + **Emcur® Fußpilz-Gel** darf nicht bei einer Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe verwendet werden. Brechen Sie die Behandlung mit **Emcur® Fußpilz-Gel** sofort ab, wenn Reizungen oder allergische Reaktionen auftreten. Wenn die Symptome länger als 14 Tage anhalten, wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- + **Emcur® Fußpilz-Gel** sollte bei Schwangeren, Stillenden und Diabetikern nur nach Rücksprache mit einem Arzt beziehungsweise unter dessen Aufsicht angewendet werden.
- + Bitte immer außer Reichweite von Kindern lagern.
- + Tube vorsichtig drücken und nach Gebrauch fest verschließen.
- + Bitte nicht bei akuten Symptomen wie verletzter oder geschädigter Haut oder an offenen Wunden anwenden.
- + Bitte nicht im Falle von vesikulobullösen, sekundären bakteriellen Infektionen, Zellulitis oder Lymphangitis anwenden.










ZUSÄTZLICHE EMPFEHLUNGEN

- + Achten Sie darauf Ihre Füße nach dem Waschen gründlich zu trocknen – auch zwischen den Zehen.
- + Tragen Sie Baumwollsocken, um Ihre Füße frisch und trocken zu halten. Wechseln Sie die Socken bei starkem Schwitzen regelmäßig.
- + Wechseln Sie regelmäßig Ihre Schuhe und lassen Sie sie ausreichend lüften und trocknen. Vermeiden Sie Schuhe aus synthetischen Materialien.
- + Wählen Sie passende Schuhe, die nicht zu eng oder zu geschlossen sind, damit Ihre Füße atmen können.
- + Tragen Sie in öffentlichen bzw. gemeinschaftlich genutzten Nassbereichen (Umkleidekabinen, Schwimmbäder, Saunen usw.) immer Badeschuhe.

NEBENWIRKUNGEN

Es sind keine Nebenwirkungen bei der Anwendung von **Emcur® Fußpilz-Gel** bekannt.

ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE

-  Nicht unter 5°C und nicht über 25°C lagern. Nicht einfrieren.
-  Tube nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.
-  Nach Anbruch bis zu 12 Monate anwendbar. Verwenden Sie das Produkt nicht mehr nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums.
-  Charge / Verwendbar bis
-  Die Anforderungen der Medizinprodukt-richtlinie werden eingehalten.
-  Medizinprodukt
-  Einzelner Patient – mehrfach anwendbar
-  Hersteller
-  Gebrauchsanweisung beachten

STAND DER INFORMATION

November 2021



Serrix B.V.
Herengracht 458
NL-1017 CA Amsterdam

VERTRIEB

EMCUR GmbH
Mainzer Straße 1c
DE-56130 Bad Ems
service@emcur.com

